

Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата

ВАЗОСПОНИН

Наименование лекарственного препарата (Vazosponinum)

Регистрационный номер: ЛП-000793

Торговое наименование: Вазоспонин

Международное непатентованное или группировочное наименование: Диоскореи ниппонской корневищ с корнями экстракт

Лекарственная форма: таблетки

Состав на одну таблетку

Активный компонент

Полиспонин - 0,10г

(Диоскореи ниппонской корневищ с корнями экстракт)

экстракт сухой с содержанием суммы фураста- ноловых агликонов в пересчете на диосгенин и абсолютно сухое вещество 1,0 %

Вспомогательные вещества

Сахар молочный (лактозы моногидрат) - 0,017г

Крахмал картофельный - 0,013г

Магния оксид - 0,007г

Кальция стеарат - 0,003г

Масса таблетки - 0,14г

Описание

Таблетки круглые плоскоцилиндрической формы с фаской, от светло-коричневого до коричневого цвета с более светлыми и более темными вкраплениями.

Фармакотерапевтическая группа

Гиполипидемическое средство растительного происхождения.

Код АТХ

[C10AX].

Фармакологическое действие

Снижает уровень холестерина, повышает содержание фосфолипидов в крови и снижает коэффициент холестерин/фосфолипиды; снижает артериальное давление.

Показания к применению

Гиперхолестеринемия (легкая и умеренная).

Атеросклероз сосудов головного мозга как в начальных его стадиях (в целях профилактики), так и при выраженных формах заболевания; при атеросклерозе сосудов сердца и при сочетании атеросклероза с гипертонической болезнью (в составе комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Противопоказано применение препарата при беременности и в период грудного вскармливания в связи с отсутствием специальных данных о безопасности применения у данной категории пациентов.

С осторожностью

Артериальная гипотония.

Способ применения и дозы

Внутрь. По 1–2 таблетки 2–3 раза в день после еды. Лечение проводят циклами по 20–30 дней с 7–10-дневными перерывами. Курс лечения 3–4 месяца.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции (кожный зуд), снижение аппетита, повышенное потоотделение. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

При передозировке возможно усиление дозозависимых побочных эффектов.

Взаимодействие с другими лекарственными препаратами

Не установлено.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска

Таблетки 100 мг. По 10 или 30 таблеток в контурную ячейковую упаковку. 2, 3, 5 или 9 контурных ячейковых упаковок по 10 таблеток или 3, 6 контурных ячейковых упаковок по 30 таблеток вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель / Организация, принимающая претензии потребителей:

ЗАО «ВИФИТЕХ», Россия

Адрес местонахождения: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ. Тел./факс: (495) 716–15–81, 716–15–90.

Адрес места осуществления производства:

142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, корп. 84, корп. 87, зд. 90.