

Наименование

Аралия Маньчжурская настойка фл. 25мл Кировская ФФ АО

Производитель / Страна

Кировская фармацевтическая фабрика / Россия

Условия отпуска

Отпускается без рецепта

Действующее вещество

Аралии маньчжурской корней настойка

Состав

Активный компонент: аралии маньчжурской корни
- 200 г Вспомогательное вещество: этанол (спирт этиловый) 70 % - достаточное количество до получения 1000 мл настойки.

Фармакологическая группа

Лекарственные растения, тонизирующие центральную нервную систему

Фармакологическое действие

Стимулирует центральную нервную систему, оказывает тонизирующее, гипертензивное, гипогликемическое действие.

Показания к применению

Артериальная гипотония, астенический синдром, физическое и психическое переутомление.

Способ применения и дозировка

Препарат принимают внутрь, после еды. Перед употреблением взбалтывать. Взрослым и детям старше 12 лет по 30-40 капель 2 раза в день (утром и в середине дня). Курс лечения 15-30 дней. Повторный курс - по рекомендации врача.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, артериальная гипертензия, острый период течения инфекционно-воспалительных заболеваний, хронические заболевания печени, повышенная возбудимость, нарушение сна (бессонница), эпилепсия, гиперкинез, беременность, период грудного вскармливания, детский возраст до 12 лет.

Побочное действие

Нарушения со стороны иммунной системы: аллергические реакции. Нарушения со стороны эндокринной системы: гипогликемия. Нарушения со стороны нервной системы: нарушение сна (бессонница), эйфория, нервозность, головная боль. Нарушения со стороны сердца: повышение артериального давления. Нарушения со стороны сосудов: тахикардия. Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта: диарея. Если при

применении препарата наблюдаются нежелательные реакции, или Вы заметили побочные эффекты, не указанные в данной инструкции, прекратите применение препарата и обратитесь к врачу.

Передозировка

Симптомы: тошнота, рвота, носовое кровотечение, гипогликемия. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие

Возможно потенцирование действия стимуляторов и аналептиков (кофеин, камфора, фенамин и др.); препарат является физиологическим антагонистом снотворного действия средств, угнетающих центральную нервную систему (в том числе барбитуратов, транквилизаторов, противосудорожных средств, седативных препаратов и т.д.).

Особые указания

С осторожностью: алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга. Препарат противопоказан при беременности и в период грудного вскармливания. Препарат следует принимать в первой половине дня, во избежание нарушения сна. Имеется четко выраженная сезонность действия: применение осенью и зимой наиболее эффективно. Если слабость, усталость наблюдаются продолжительное время и вызваны неясными причинами, следует обратиться к врачу. Содержание абсолютного спирта в максимально разовой дозе для взрослых и детей старше 12 лет - 0,96 г, в максимальной суточной дозе для взрослых и детей старше 12 лет - 1,93 г. 2 Вследствие наличия в препарате этанола возможно снижение скорости психомоторных реакций. В период применения препарата следует воздержаться от управления транспортными средствами, занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре от 15 до 25 °С.

Срок годности

36 месяцев

Список болезней

Гипертензия артериальная